

Benefic pentru intestin în diareea acută

Când intestinul intră în grevă, chiar și mici modificări în dietă pot avea efecte mari.
Iată câteva sfaturi pentru a face față diareei.

✓ Beți multe lichide

- » soluții de glucoză – electroliti (de la farmacie)
- » supă sărată

✓ La început mâncați alimente ușor de digerat

- » ex. dieta BRAT (banane, orez, sos de mere și pâine prăjită) sau dieta CRAM (cereale, orez, sos de mere și lapte), supă de morcov sau terci

✓ De preferat mâncați doar

- » alimente cu proteine, cu conținut scăzut de grăsimi și fără lactoză
- » carbohidrați ușor de digerat

✗ Evitați

- » Alimentele grase și condimentate
- » Legumele bogate în fibre, cum ar fi varza, mazărea, fasolea și linte
- » Băuturile reci, băuturile acidulate, alcool și cafea, fumatul

✗ Mai puține grăsimi, cum ar fi uleiurile vegetale, margarina și untul.

✓ Diareea la copiii mici

Administrarea unei cantități suficiente de apă și electroliti, chiar de la început, este cel mai important mod de a preveni deshidratarea.
La câteva ore după rehidratarea cu succes, copiii pot mânca o dietă normală, cu alimente pe care le-au tolerat înainte.

✓ Contactați un medic de fiecare dată când diareea este severă și persistentă

Tasectan® Inovație

- ➔ Îmbunătățește rapid și sigur simptomele de diaree
- ➔ Acționează exclusiv la nivel intestinal și nu este absorbit în organism
- ➔ Respectă și restabilește compoziția fiziologică a florei intestinale
- ➔ Nu are efecte negative asupra funcției intestinale
- ➔ Sigur și pentru copiii cu vârsta mai mică de trei ani
- ➔ Nu conține lactoză, gluten, drojdie de bere sau soia
- ➔ Disponibil în farmacii. Se eliberează fără prescripție medicală.

★ În caz de nevoie:
Tasectan ar trebui să fie prezent în fiecare casă
și în trusa de prim ajutor de călători



Tasectan®

PENTRU TOATE TIPURILE DE DIAREE



Bibliografie

<http://www.fet-ev.eu/index.php/ernaehrungstherapien/137-ernaehrungstherapie-diarrhoe> | <http://www.oege.at>
Rodeck, Zimmer: „Pädiatrische Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung“, Springer Medizin Verlag, 2008

TASECTAN® PENTRU TOATE TIPURILE DE DIAREE¹

INOVAȚIE ÎN TRATAMENTUL DIAREEI

8 metri de sănătate

Digestia sănătoasă este una dintre principalele fundamente ale stării noastre de bine. Nu este o surpriză că intestinul uman, cu o suprafață de până la 500 m², este cea mai importantă parte a tractului digestiv și joacă un rol important în apărarea corpului nostru de îmbolnăviri.

Montavit este o companie de familie, din Austria, cu o experiență de peste 70 de ani în piața farmaceutică. În calitate de furnizor de produse inovative suntem mereu în căutarea unor îmbunătățiri, în special metode noi de tratare a bolilor. Tasectan oferă întregii familii o abordare complet nouă, eficientă, blândă împotriva diareei.

Tasectan – Inovație


Triplă acțiune Tasectan

- » Protejează peretele intestinal formând un film protector
- » Neutralizează germenii și toxinele care provoacă diareea, prin împiedicarea contactului acestora cu mucoasa intestinală
- » Contribuie la eliminarea patogenilor responsabili de diaree și restabilește rapid funcționarea normală a peretelui intestinal

Tasectan lasă flora intestinală în starea sa naturală și nu afectează motilitatea intestinală normală.

Datorită abordării sale inovatoare și ingredientelor naturale, Tasectan poate fi administrat și la copiii cu vârsta mai mică de trei ani.

Pentru toate tipurile de diaree



TASECTAN protejează


Peretele intestinal împotriva germenilor care cauzează diareea.

Tasectan formează o **peliculă protectoare** pe suprafața inflamată a peretelui intestinal.



TASECTAN neutralizează

Germenii și toxinele, care cauzează diareea.



TASECTAN elimină

Agentii patogeni **responsabili pentru diaree** și restabilește rapid **funcționarea normală** a peretelui intestinal

Tasectan® Pentru întreaga familie



Adulți

- 1-2 capsule la fiecare 4-6 ore, până la dispariția simptomelor
- Înghițiți capsulele cu multă apă



... ȘI PENTRU COPILII
CU VÂRSTA MAI
MICĂ DE TREI ANI

Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani

- 1 plic la fiecare 6 ore până la dispariția simptomelor

Copiii între 3-14 ani

- 1 sau 2 plicuri la fiecare 6 ore până la dispariția simptomelor

Se dispersează conținutul plicului într-o cantitate mică de apă, lapte sau suc de fructe. Se amestecă bine și se administrează imediat.

TASECTAN este un dispozitiv medical folosit pentru a restabili funcția fiziologică a pereților intestinali. Este conceput specific pentru a controla și reduce simptomele asociate cu diareea provocată de diverse cauze, simptome cum ar fi tensiunea abdominală și defecările frecvente. Efectul apare în primele 12 ore. Gelatina tanat din care este compus produsul nu este modificată la nivelul stomacului și acționează prin formarea unui film care protejează mucoasa intestinală, reducând frecvența și durata episoadelor diareice. Dispozitivul medical este disponibil sub formă de capsule pentru adulți sau pudră pentru uz pediatric. **Compoziție:** capsule: gelatină tanat, amidon de porumb, stearat de magneziu; Pudră pentru uz pediatric: gelatină tanat

Atenționări! Înainte de a începe să folosiți acest produs nu este necesar să consultați un profesionist din domeniul medical. Totuși, se recomandă consultul în caz de simptome severe sau persistente, sau când există îndoieli cu privire la diagnostic, mai ales la copiii sub 3 ani și la persoanele în vârstă; În caz de diaree la copiii cu vârsta mai mică de 3 ani, mai ales când sunt prezente și alte simptome, se recomandă consultarea unui profesionist din domeniul medical; Este indicat consumul abundent de lichide, precum și măsurile de regim alimentar normale folosite în tratamentul diareei (rehidratarea orală); Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, se recomandă ca produsul să nu fie utilizat pe durata sarcinii sau în primele luni de alăptare. În astfel de cazuri, întotdeauna consultați-vă mai întâi medicul. **Contraindicații și efecte nedorite:** TASECTAN nu trebuie folosit la pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la gelatină tanat sau orice alt ingredient al produsului.

Produsul este un dispozitiv medical, disponibil în farmacii. Pentru mai multe informații consultați prospectul sau întrebați medicul sau farmacistul.

